

ヒトパピローマウイルス予防接種後の注意事項及び接種済証

- ①ワクチン接種後24時間は、健康状態の変化に注意しましょう。特に、接種直後30分以内は、急激な健康状態の変化に注意しましょう。
- ②接種後、接種局所の異常反応や体調の変化がみられた場合は、速やかに接種医やかかりつけ医の診察を受けましょう。
- ③接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は激しい運動を避けるようにしましょう。
- ④予防接種当日の入浴は差し支えありません。

■副反応■ 詳しくは厚生労働省作成のリーフレットを御確認ください。

・注射部位の疼痛、熱感、腫脹、発赤が認められます。筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、頭痛、発熱もみられることがあります。2～3日で消失します。まれに重い副反応として、重いアレルギー症状、神経系の症状が起こることがあります。

■ヒトパピローマウイルスワクチンに関する相談先■

○接種後に、健康に異常があるとき

→接種を受けた医師、かかりつけの医師、HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に関する協力医療機関

※協力医療機関の受診については、接種を受けた医師又はかかりつけの医師に御相談ください

○予防接種による健康被害についての補償(救済)に関する相談

→つくば市予防接種・感染症対策室

母子健康手帳に接種記録を記載した場合には下記接種記録は省略可

ヒトパピローマウイルス予防接種済証			
住 所:	つくば市 _____		
氏 名:	_____		
生年月日:	平成	年	月 日
接種回数	接種年月日	医療機関名	ワクチン名/ロット
1回目			
2回目			
3回目			

※紛失等で母子健康手帳に接種歴の記載できない場合は、次回接種の際にも必ずこの用紙を御持参ください。

この用紙は接種の証明となりますので大切に保管しておいてください。

【問合せ先】

つくば市予防接種・感染症対策室 TEL 029-883-1111(代表)



←厚生労働省
ホームページ
HPVワクチン情報

ヒトパピローマウイルス予防接種後の注意事項及び接種済証

- ①ワクチン接種後24時間は、健康状態の変化に注意しましょう。特に、接種直後30分以内は、急激な健康状態の変化に注意しましょう。
- ②接種後、接種局所の異常反応や体調の変化がみられた場合は、速やかに接種医やかかりつけ医の診察を受けましょう。
- ③接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は激しい運動を避けるようにしましょう。
- ④予防接種当日の入浴は差し支えありません。

■副反応■ 詳しくは厚生労働省作成のリーフレットを御確認ください。

・注射部位の疼痛、熱感、腫脹、発赤が認められます。筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、頭痛、発熱もみられることがあります。2～3日で消失します。まれに重い副反応として、重いアレルギー症状、神経系の症状が起こることがあります。

■ヒトパピローマウイルスワクチンに関する相談先■

○接種後に、健康に異常があるとき

→接種を受けた医師、かかりつけの医師、HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に関する協力医療機関

※協力医療機関の受診については、接種を受けた医師又はかかりつけの医師に御相談ください

○予防接種による健康被害についての補償(救済)に関する相談

→つくば市予防接種・感染症対策室

母子健康手帳に接種記録を記載した場合には下記接種記録は省略可

ヒトパピローマウイルス予防接種済証			
住 所:	つくば市 _____		
氏 名:	_____		
生年月日:	平成	年	月 日
接種回数	接種年月日	医療機関名	ワクチン名/ロット
1回目			
2回目			
3回目			

※紛失等で母子健康手帳に接種歴の記載できない場合は、次回接種の際にも必ずこの用紙を御持参ください。

この用紙は接種の証明となりますので大切に保管しておいてください。

【問合せ先】

つくば市予防接種・感染症対策室 TEL 029-883-1111(代表)



←厚生労働省
ホームページ
HPVワクチン情報