

## 対象者基準ガイドライン(60歳以上65歳未満で該当する方は、定期接種対象者)

心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害の程度は、次のいずれかに該当するものであること。  
(予防接種法の一部を改正する法律等の施行について 平成13年11月7日 健発第1058号)

### 1. 心臓機能障害

(1) 次のいずれか2つ以上の所見があり、かつ、安静時又は自己の身の日常生活活動でも心不全症状、狭心症症状又は繰返しアダムスストークス発作が起こるもの。

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| ①胸部エックス線写真所見で心胸比0.60以上のもの | ⑤心電図で第二度以上の不完全房室ブロック所見があるもの                        |
| ②心電図で陳旧性心筋梗塞所見があるもの       | ⑥心電図で心房細動又は粗動所見があり、心拍数に対する脈拍数の欠損が10以上のもの           |
| ③心電図で脚ブロック所見があるもの         | ⑦心電図でSTの低下が0.2mV以上の所見があるもの                         |
| ④心電図で完全房室ブロック所見があるもの      | ⑧心電図で第Ⅰ誘導、第Ⅱ誘導および胸部誘導(ただしV1を除く)のいずれかのTが逆転した所見があるもの |

(2) 人工ペースメーカーを装着したもののまたは人工弁移植、弁置換を行ったもの

### 2. 腎臓機能障害

腎臓機能検査において、内因性クレアチンクリアランス値が10ml/分未満、または血清クレアチニン濃度が8.0mg/dl以上であって、かつ、自己の身の日常生活活動が著しく制限されるか、又は血液浄化を目的とした治療を必要とするもの若しくは極めて近い将来に治療が必要となるもの。

### 3. 呼吸器機能障害

予測肺活量1秒率、動脈血ガス及び医師の臨床所見により、呼吸困難が強いため歩行がほとんどできないもの、呼吸障害のため予測肺活量1秒率の測定ができないもの、予測肺活量1秒率が20以下のものまたは動脈血酸素分圧50Torr以下のもの。予測肺活量1秒率とは、1秒量(最大呼気位から最大努力下呼出の最初の1秒間の呼気量)の予測肺活量(性別、年齢、身長)の組合せで正常ならば当然であると予測される肺活量の値)に対する百分率である。

### 4. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害

ヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) CD4陽性Tリンパ球数が200/ $\mu$ l以下で、次の項目(①~⑫)のうち6項目以上が認められるもの

- ①白血球について3000/ $\mu$ l未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
- ②Hb量について男性12g/dl未満、女性11g/dl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
- ③血小板について10万/ $\mu$ l未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
- ④ヒト免疫不全ウイルス-RNA量について5000コピー/ml以上の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
- ⑤1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労が月に7日以上ある
- ⑥健常時に比し10%以上の体重減少がある
- ⑦月に7日以上不定の発熱(38℃以上)が2ヵ月以上続く
- ⑧1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある
- ⑨1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある
- ⑩口腔内カンジタ症(頻回に繰り返すもの)、赤痢アメーバ症、带状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症(頻回に繰り返すもの)、糞線虫症および伝染性軟属腫等の日和見感染症の既往がある
- ⑪生鮮食品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である
- ⑫軽作業を越える作業の回避が必要である

(2) 回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど不可能な状態のもの