

## ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害

ヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) CD4陽性Tリンパ球数が200/ $\mu$ l以下で、次の項目(①～⑫)のうち6項目以上が認められるもの

- ①白血球について3000/ $\mu$ l未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
- ②Hb量について男性12g/dl未満、女性11g/dl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
- ③血小板について10万/ $\mu$ l未満の状態が四週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
- ④ヒト免疫不全ウイルス-RNA量について5000コピー/ml以上の状態が四週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
- ⑤1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労が月に7日以上ある
- ⑥健常時に比し10%以上の体重減少がある
- ⑦月に7日以上 of 不定の発熱(38℃以上)が2ヵ月以上続く
- ⑧1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある
- ⑨1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある
- ⑩口腔内カンジタ症(頻回に繰り返すもの)、赤痢アメーバ症、带状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症(頻回に繰り返すもの)、糞線虫症および伝染性軟属腫等の日和見感染症の既往がある
- ⑪生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である
- ⑫軽作業を越える作業の回避が必要である

(2) 回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど不可能な状態のもの